

AIDE À LA DISPENSATION DE NALOXONE

Document du CEIP-Addictovigilance PACA Corse destiné aux pharmacies d'officine

Intérêt d'une diffusion large de naloxone

- Les opioïdes sont des médicaments essentiels dans la prise en charge de la douleur et des addictions
- Leur consommation peut s'accompagner de risques en particulier : dépendance, mésusage, trouble de l'usage et surdose
- En France, 75% des décès par surdose sont dus aux opioïdes ([DRAMES 2021](#))
- 70% des décès se déroulent en présence d'un témoin ([ONU](#))
- La naloxone est l'antidote spécifique des opioïdes
- Des formes « prêtes à l'emploi » existent et sont utilisables par tous

Le pharmacien d'officine acteur de la Réduction des Risques et des Dommages

Mettre à disposition du matériel d'injection stérile

PESP : Programme d'Échange de Seringues en Pharmacie

Faciliter l'accès aux Traitements de Substitution aux Opioides (TSO)

Echange avec le prescripteur, entretien d'initiation bon usage du médicament, créer une relation de confiance

Prévenir les surdoses aux opioïdes

Promouvoir le bon usage des opioïdes, l'accès et l'utilisation du kit de naloxone. Sensibiliser les patients à risque et leur entourage

NALOXONE Prête à l'emploi :



3 formes disponibles

	Prenoxad® disponible depuis mai 2019	Nyxoid® depuis septembre 2021	Ventizolve® depuis octobre 2023
CIP	34009 301 545 7 1	34009 301 813 9 3	34009 301 616 8 5
Indication thérapeutique	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 18 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 14 ans	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de 18 ans
Voie d'administration et forme pharmaceutique	Solution injectable en seringue pré-remplie pour voie Intra-musculaire	Solution pour pulvérisation nasale	Solution pour pulvérisation nasale
Contenu	1 seringue de 5 doses graduées (~ 0,36 mg/dose)	2 récipients unidoses de 1,8 mg	2 récipients unidoses de 1,26 mg
Conditions de prescription	Prescription médicale facultative	Prescription médicale obligatoire	Prescription médicale facultative
Lieux de dispensation	Pharmacie d'officine, CSAPA & CAARUD, hôpital	Pharmacie d'officine, CSAPA, hôpital	CSAPA & CAARUD, hôpital
Prix et remboursement	22,16€ TTC Taux de remboursement : 65%	31,40€ TTC Taux de remboursement : 65%	<i>En attente</i>
Commande	Auprès des grossistes répartiteurs	Auprès des grossistes répartiteurs Auprès du dépositaire CSP par mail (pharmacie@csp-epl.com) ou fax (09 71 00 70 35)	Auprès du laboratoire CEVIDRA contact@cevidra.com (04 93 70 58 31)

POUR QUI ?

Situations à risques de surdoses parmi les consommateurs d'opioïdes de TSO, de médicaments opioïdes antalgiques, de substances opioïdes illicites



Initiation d'un traitement, perte de tolérance

(après un arrêt ou une diminution des prises d'opioïdes par exemple : patient sortant de prison, de sevrage, de centre de soins)



Patient présentant une dépendance



Patient en mésusage ou **troubles de l'usage** de médicaments opioïdes : augmentation des doses, recherche d'effets psychoactifs, nomadisme médical...



Patients exposés à des interactions pharmacologiques : association avec d'autres dépresseurs (autres opioïdes, benzodiazépines, alcool, prégabaline, etc.)



Usagers en « auto substitution » pour soulager une opio-dépendance



Patients avec **antécédents** de surdose aux opioïdes



Patients souffrant de comorbidités psychiatriques



Patients avec terrain à risque : insuffisants respiratoires, rénaux ou hépatiques, personnes âgées, obésité, patients fébriles, déshydratation, etc...



Intoxication accidentelle (enfant...)

COMMENT REPÉRER LE MÉSUSAGE ET LE TROUBLE DE L'USAGE ?

- Consultation de l'historique de dispensation (logiciel ou dossier pharmaceutique)
- Ordonnance suspecte*
- Utilisation d'échelle de repérage du mésusage Prescription Opioid Misuse Index (POMI)
- Échange avec un autre professionnel, avec le patient, un proche du patient

*Déclaration au CEIP-Addictovigilance, formulaire de déclaration OSIAP sur le site de [l'ANSM](http://www.ansm.fr)

QUE FAIRE ?

- Informer sur le risque de surdoses (facteurs de risque, signes cliniques...)
- Dispenser un kit de naloxone et informer sur la conduite à tenir en cas de suspicions de surdose
- Orientation vers des centres/services d'addictologie (CSAPA, CAARUD...), médecins

Pour aller plus loin

- La Réduction des Risques et des Dommages dans le champ de l'addiction aux opioïdes disponible sur cespharm.fr
- Le [guide de l'addictologie](#) en pharmacie d'officine
- Délivrance des TSO à l'officine & Outils de réduction des risques : <https://www.officinetso.org>
- Le site naloxone.fr
- Les liens vers les laboratoires : [Prenoxad®](#) [Nyxoid®](#) [Ventizolve®](#)
- Les mesures additionnelles de réduction des risques sur le site de l'ANSM : [Nyxoid®](#) [Prenoxad®](#) [Ventizolve®](#)

Les deux principaux signes d'une surdose opioïde



Dépression respiratoire, fréquence respiratoire <10/minute



Trouble de la conscience, coma, absence de réponse à un bruit fort ou au toucher

Sur le site du CEIP-Addictovigilance PACA Corse

- [La foire aux questions sur la naloxone](#)
- [Affiches et vidéos sur la naloxone](#)
- [Les échelles POMI et ORT](#)


[Vidéo « Agir en cas de surdose opioïde »](#)



Pour tout cas de troubles liés à l'usage d'opioïde, de surdose ou une question

CEIP-Addictovigilance PACA Corse
Tel.: 04 91 74 50 25
addictovigilance@ap-hm.fr

<http://fr.ap-hm.fr/site/ceip-addictovigilance-marseille>



Hôpitaux Universitaires de Marseille | **ap-hm**

