AIDE À LA PRESCRIPTION DE NALOXONE

Destiné à tous les médecins

Pourquoi prescrire de la naloxone ?

- Les médicaments opioïdes peuvent être responsables de surdoses
- La naloxone est l'antidote spécifique des opioïdes
- Des formes « prêtes à l'emploi » sont utilisables par tous

Quand en prescrire?

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande d'évaluer systématiquement la pertinence d'une prescription de naloxone prête à l'emploi, lors de la prescription d'un opioïde (1). Et ce, quel que soit l'opioïde : antalgiques de palier 2 ou 3, médicaments de substitution aux opioïdes, substances illicites.

(1) Les recommandations de bonne pratique : « Bon usage des médicaments opioïdes : antalgie, prévention et prise en charge du trouble de l'usage et des surdoses »

Certaines situations à risque de surdose

- **Initiation de traitement**, perte de tolérance aux opioïdes
- Patients présentant une **dépendance** physique
- **Patients en mésusage** ou trouble de l'usage de médicaments opioïdes : augmentation des doses, recherche d'effets psychoactifs, nomadisme médical, etc.
- Patients exposés à des **interactions pharmacologiques** : association avec d'autres dépresseurs
- Patients recevant un **médicament de substitution** aux opioïdes
- Patients avec **antécédent de surdose** aux opioïdes
- Patients souffrant de comorbidités psychiatriques
- Patients insuffisants respiratoires, rénaux ou hépatiques, personnes âgées, personnes obèses, patients fébriles, déshydratés, etc.

NALOXONE Les spécialités disponibles	Prenoxad®	Nyxoid®	Ventizolve®
Indication thérapeutique	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de **18 ans**	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de **14 ans**	Traitement d'urgence des surdoses opioïdes à partir de **18 ans**
Voie d'administration	Solution injectable en seringue pré-remplie pour voie intramusculaire	Solution pour pulvérisation nasale	Solution pour pulvérisation nasale
Contenu	1 seringue de 5 doses graduées (~ 0,36 mg/dose)	2 récipients unidoses de 1,8 mg	2 récipients unidoses de 1,26 mg
Conditions de prescription	Prescription médicale **facultative**	Prescription médicale **obligatoire**	Prescription médicale **facultative**
Lieux de dispensation	Pharmacie d'officine, CSAPA & CAARUD, hôpital	Pharmacie d'officine, CSAPA, hôpital	Pharmacie d'officine, CSAPA & CAARUD, hôpital
Prix et remboursement	22,16€ (hors honoraire de dispensation) Taux de remboursement : 65%	31,40€ (hors honoraire de dispensation) Taux de remboursement : 65%	Non remboursable Prix libre

En pratique Pour les spécialités remboursables à ce jour, prescription au choix : Prenoxad® ou Nyxoid® sur **ordonnance simple.**

Expliquer au patient : les situations à risque de surdose, les signes de surdose, comment utiliser le kit de naloxone, l'intérêt d'en parler à son entourage.

Exemples d'ordonnance type

Nom Prénom du patient, âge

NALOXONE (NYXOID 1,8mg, solution nasale pour pulvérisation) : 1 boite

Administrer par voie nasale si signes cliniques en lien avec une surdose aux opioïdes (une dépression respiratoire et/ou une dépression du système nerveux central)

Contacter les secours 15 ou 112
Dose initiale de 1,8mg administrée dans une narine (1er pulvérisateur nasal)
Placer la personne en position latérale de sécurité
En l'absence d'amélioration après 2 à 3 minutes : utiliser le 2ème pulvérisateur
Si l'état du patient s'améliore à la première administration puis se dégrade : utiliser le 2ème pulvérisateur
Surveiller l'état du patient jusqu'à l'arrivée des secours

Se référer à la notice pour plus d'information

Nom prénom du patient, âge

NALOXONE (PRENOXAD 0,91mg/ml, solution injectable en seringue préremplie) : 1 boite

Administrer par voie intramusculaire si signes cliniques en lien avec une surdose aux opioïdes (une dépression respiratoire et/ou une dépression du système nerveux central).

Une seringue contient 5 doses graduées, chaque graduation correspond à une dose de 0,4ml

Contacter les secours 15 ou 112
Dose initiale : 0,4ml (une graduation)
Placer la personne en position latérale de sécurité
En l'absence d'amélioration après 2 à 3 minutes : nouvelle dose
Si l'état du patient s'améliore à la première administration puis se dégrade : nouvelle dose
Surveiller l'état du patient jusqu'à l'arrivée des secours

Se référer à la notice pour plus d'information

Pour aller plus loin

- Le site naloxone.fr
- Les sites vers les laboratoires : mundipharma.com, prenoxad.fr, ventizolve.com
- Les mesures additionnelles de réduction des risques sur le site de l'ANSM : Nyxoid® Prenoxad® Ventizolve®

Les deux principaux signes d'une surdose opioïde

Dépression respiratoire, fréquence respiratoire <10/minute

Trouble de la conscience, coma, absence de réponse à un bruit fort ou au toucher

Outils disponibles sur le site du CEIP-Addictovigilance PACA Corse

Découvrez toutes les ressources POP sur notre site

Foire aux questions

Vidéos naloxone

Pour tout renseignement
CEIP-Addictovigilance PACA Corse
Tel.: 04 91 74 50 25
addictovigilance@ap-hm.fr

CEIP-ADDICTOVIGILANCE PACA CORSE – MAJ septembre 2026