

Je ne comprends pas ... depuis
je suis agité,
anxieux,
j'ai des sueurs ...
que j'ai
arrêté mon
traitement
opioïde.

Le syndrome de sevrage
apparaît lorsqu'un opioïde
est en quantité insuffisante
dans l'organisme. Il peut
s'en suivre une série de
symptômes désagréables.
C'est physiologique !

Ces symptômes
peuvent arriver en cas
de diminution trop
rapide des doses
ou d'un arrêt brutal.

Mais c'est logique !!!
Si on stoppe son
traitement d'un coup
le corps est
en manque.

Prends
rendez-vous
avec ton médecin
traitant !

Fentanyl Tramadol Buprénorphine Oxycodone
Codéine Méthadone Morphine Poudre d'opium

Évitez l'arrêt brutal
d'un traitement opioïde

Les symptômes de sevrage

Votre
professionnel
de santé

Notre conseil

Quelles que soient la dose et la durée du traitement, il est conseillé de planifier une diminution progressive de la dose avec son médecin.

Retrouvez
tous les
supports
POP sur
notre site



Symptômes physiques



Tachycardie



Douleurs osseuses
et articulaires



Sudation



Crampes abdominales,
nausées, vomissements
et diarrhée



Frissons ou
chair de poule



Tremblements



Pupilles
dilatées



Baillements

Symptômes psychologiques



Agitation



Anxiété

Pour toute information
CEIP-Addictovigilance PACA Corse



addictovigilance@ap-hm.fr



**Hôpitaux
Universitaires
de Marseille** | **ap-hm**

ars
Agence Régionale de Santé
Provence-Alpes
Côte d'Azur