

Je ne comprends pas  
je suis agité,  
anxieux,  
j'ai des sueurs ...

... depuis  
que j'ai arrêté  
mon  
traitement  
opioïde.

Le syndrome de sevrage  
apparaît lorsqu'un opioïde  
est en quantité insuffisante  
dans l'organisme. Il peut  
s'en suivre une série de  
symptômes désagréables.  
C'est physiologique !

Ces symptômes  
peuvent arriver en cas  
de diminution trop  
rapide des doses  
ou d'un arrêt brutal.

Mais c'est logique !  
Si on stoppe son  
traitement d'un coup  
le corps est  
en manque.

Prends  
rendez-vous  
avec ton médecin  
traitant !




Évitez l'arrêt brutal  
d'un traitement opioïde

Les  
opioïdes

Fentanyl Tramadol Buprénorphine Oxycodone  
Codéine Méthadone Morphine Poudre d'opium

# Les symptômes de sevrage

Votre  
professionnel  
de santé



## Symptômes physiologiques



Tachycardie



Douleurs osseuses  
et articulaires



Sudation



Crampes abdominales,  
nausées, vomissements  
et diarrhée



Frissons ou  
chair de poule



Tremblements



Pupilles dilatées



Baillements

## Symptômes psychologiques



Agitation



Anxiété

## Notre conseil

Quelles que  
soient la dose  
et la durée  
du traitement,  
il est conseillé  
de planifier une  
**diminution  
progressive de  
la dose avec  
son médecin.**

Pour toute information  
CEIP-Addictovigilance PACA Corse

 [addictovigilance@ap-hm.fr](mailto:addictovigilance@ap-hm.fr)

